
$\mathcal{B}(B^+ \to K^+\mu^+\mu^-)$ $[1.1, 6.0]$
$\mathcal{B}(B^+ \to K^+e^+e^-)$ $[1.1, 6.0]$
$\mathcal{B}(B^+ \to K^+\nu\bar{\nu})$
$\mathcal{B}(B_s^0 \to \phi\mu^+\mu^-)$ $[1.0, 6.0]$
$\mathcal{B}(B_s^0 \to \phi e^+e^-)$ $[1.1, 6.0]$
$\mathcal{B}(B_s^0 \to \mu^+\mu^-)$
$\mathcal{B}(B^0 \to \mu^+\mu^-)$
$P_5'(B^0 \to K^{*0}\mu^+\mu^-)$ $[2.5, 4.0]$
$P_5'(B^0 \to K^{*0}\mu^+\mu^-)$ $[4.0, 6.0]$
R_K $[0.1, 1.1]$
R_K $[1.1, 6.0]$
$R_{K_S^0}$ $[1.1, 6.0]$
$R_{K^{*0}}$ $[0.1, 1.1]$
$R_{K^{*0}}$ $[1.1, 6.0]$
$R_{K^{*+}}$ $[0.045, 6.0]$
$R_{K\pi\pi}$ $[1.1, 7.0]$
R_{pK} $[0.1, 6.0]$
R_ϕ $[1.1, 6.0]$
Muon $g-2$ (WP)
Muon $g-2$ (BMW)
$R(D)$
$R(D^*)$
$R(J/\psi)$
$R(\Lambda_c^+)$
$\mathcal{B}(B^+ \to \tau^+\nu)$
Δm_d
Δm_s
−6 −5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6
Pull in σ